

醫

方

集

解

醫方集解卷之六

休寧初菴汪

昂著

男其兩汪端

弟殿武汪

桓

姪子錫汪惟寵

收

大便秘結，小便不通，腹中脹滿，此為陽明腑實之證。治法當用承氣湯下之，利其大便，則腹中自舒。此湯能通腸胃，利小便，使邪氣從大便而出，則病自愈矣。

大

大便秘結，小便不通，腹中脹滿，此為陽明腑實之證。治法當用承氣湯下之，利其大便，則腹中自舒。此湯能通腸胃，利小便，使邪氣從大便而出，則病自愈矣。

大

大便秘結，小便不通，腹中脹滿，此為陽明腑實之證。治法當用承氣湯下之，利其大便，則腹中自舒。此湯能通腸胃，利小便，使邪氣從大便而出，則病自愈矣。

大

大便秘結，小便不通，腹中脹滿，此為陽明腑實之證。治法當用承氣湯下之，利其大便，則腹中自舒。此湯能通腸胃，利小便，使邪氣從大便而出，則病自愈矣。

大

大便秘結，小便不通，腹中脹滿，此為陽明腑實之證。治法當用承氣湯下之，利其大便，則腹中自舒。此湯能通腸胃，利小便，使邪氣從大便而出，則病自愈矣。

赤石脂禹餘糧湯

治傷寒服湯藥下利不止，心下痞硬，服瀉心湯已

復以他藥下之利不止，醫以理中與之利益甚，理中者理中焦，此利在

下焦，赤石脂禹餘糧湯主之。別清濁，復利不止者，當利其小便，利小

腸也。以實大

赤石脂禹餘糧湯等分杵碎煎

醫方集解 卷六 赤石脂禹餘糧湯 桃花湯

少陰
下利

此手陽明藥也瀉可去脫重可達下石脂餘糧之瀉以止脫重以固下

甘以益氣李先知曰下焦有病入難會須用餘糧赤石脂

桃花湯仲景治少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿

血者成氏曰陽明下利便膿血者協熱也少陰下利腹痛便膿血者下焦不約而裏寒也凡下利便膿血身冷脈小者易治身熱脈大

者難治

赤石脂一斤乾薑一斤粳米升

此足少陰藥也李時珍曰赤石脂之重瀉入下焦血分而固脫乾薑之

辛溫煖下焦氣分而補虛硬米之甘溫佐石脂乾薑而潤腸胃也米升

桃花湯主下焦血虛且寒非乾薑之溫石脂之重瀉不能入血用梗米之日以引入腸胃華緩則便膿血熱勢下流也凡下利正氣清滑脫者以乾花湯雖用乾薑然分兩最微不脂梗米居多以調正氣清滑脫者以乾薑用辛以散之之義諸便膿血皆傳經之熱邪也吳鶴皋曰少陰腎水主禁固二便為火所灼尅伐大腸庚金故下利膿血石脂藥能勝熱瀉可收膿血乾薑者假其辛熱以從故用梗米皆恐石脂性寒損胃也

成熱
解入

泄瀉
脫肛

訶子散

東垣

治虛寒泄瀉米穀不化腸鳴腹痛脫肛及作膿血日夜無度

御米穀

去蒂蜜炒五分

訶子

煨去核七分

乾薑

炮六分

橘紅

五分

右末空心服

此手足陽明藥也御米穀酸澁微寒固腎瀉腸訶子酸澁苦溫收脫佳

瀉炮薑辛熱能逐冷補陽陳皮辛溫能升陽調氣以固氣脫亦可收形

奇方長澤瀉

訶子散

真入養藏湯

二

脫也泄瀉為氣脫
脫肛為形脫

河間訶子散訶子一兩半
生半根木香五錢甘草一錢黃連三錢為末每服二錢用白

朮芍藥湯調下治瀉久腹痛漸已瀉下漸少以此止之如不止加厚朴

一竭其餘邪木香黃連香連丸也
行氣清火止痢厚腸甘草芍藥

兩竭其餘邪湯也甘緩酸收和中
止痛加訶子瀉以收脫加白朮補以

脫肛

真人養藏湯治瀉痢日久赤自己盡虛寒脫肛
肛門為大腸之使大

因以虛大腸者傳道之官腎者強作之官酒色過度則腎虛而泄母氣肺

亦治下痢赤白臍腹痛日夜無度

罌粟殼去帶蜜炙
三兩六錢訶子趙農煨一
兩三錢肉豆蔻趙農煨
五錢不香二兩肉桂八錢人

參白朮炒
六錢當歸六錢白芍炒一兩
六錢生甘草一兩
八錢每服四錢藏寒甚加

附子一方無當歸

血汗

此手足陽明藥也脫肛由于虛寒故用參朮甘草以補其虛肉桂肉苁

以祛其寒木香溫以調氣當歸潤以和肝芍藥酸以收斂訶子堅殼則

瀉以止脫也

此虛寒脫肛之劑宜大補元氣或加芍藥調血及升柴以升提之又有氣熱血熱而肛反挺出者宜用木連理柏或

四物加升麻柴胡
秦艽防風之類

附丹溪脫肛方人參黃耆當歸川芎升麻

此治氣血兩虛而脫肛者

當歸六黃湯

治陰虛有火盜汗發熱心之所搖于內者為血發于外者

裏之陽皆心主之以有其變化隨其陽氣所在之虛而生津亦因其火

擾所在之處泄而為汗是汗虛由心出也醒而出汗曰自汗為陽虛睡

而山汗曰盜汗為陰虛汗者心之陽衰者腎之陰陰虛是熱衛外之陽

乘虛而入陰中表液失其固衛故液寒然汗出覺明陽氣復而汗止矣

因熱邪乘虛而入者汗必熱因寒邪乘虛而入者汗必冷有火者

謂有面赤口乾唇燥使赤者重脉數諸症○凡傷風傷寒中風風濕采
經氣虛血虛脾虛胃熱亡陽痰飲驚悸勞役房事墮胎等症皆能
令人出汗汗多又云飲食飽甚汗出于胃而熱汗出于心持重遠行
汗出于臂扶老倦憊汗出于肝驚悸勞苦汗出于脾凡頭汗左額為肝
右額為肺鼻頰為脾額周腎額滿心津液自胃旁達于外其手足汗有

諸方提詳

卷之六 諸病六黃湯

月然胃寒二症自汗亦有屬
前者故身或初症多自汗

當歸 生地黃 熟地黃 黃芩 黃柏 黃連 黃耆 杜

此手足少陰藥也盜汗由于陰虛當歸二地所以滋陰汗由火熾黃芩

柏連所以瀉火然熱不作汗濕得汗由腠理不固信用黃耆所以固

表李時珍曰常歸六黃湯加麻黃根治盜汗其建其性能行則身肌

汗邪在牛表半裏故以和表為正古法小柴胡加桂枝之此陽虛故

以補陰為正李士材曰陰虛則元氣有耗而無升而微用此若寒濕故

之劑得無陰虛虛之或于惟火實氣微者宜之六黃湯加地骨皮白芍

耳○平晁曰陰虛陽必衰故受熱自盜當歸六黃湯加地骨皮白芍

必乘故發城自汗或黃連中湯甚者加附子或黃連湯有濕熱合非汗

出不休以成製勝其熱甘藥滋其陰黃連湯加附子或黃連湯有濕熱合非汗

之液心失所養不能攝血故盜汗為汗宜大補黃耆湯加酸棗仁有微
熱者更加石斛下靈砂丹王海藏曰黃連中黃子黃連七年諸藥不郊
子與京脂散三黃九二日病已盡將至五液化為五濕腎水上行乘心
之虛心火上炎而八肺欺其不勝皮毛以是而開為汗出也先以涼藥
散湯中粗火次以三黃九清心火以助陰則腎水運木榮大府閉而

玄黃
汗孔
也

汗自
上天

附撲汗法白朮藥末川芎名二錢半米粉一兩為末絹袋盛週身撲之治汗出

不止又方龍骨牡蠣糯米等分為末撲之

陽虛
目汗

牡蠣散 治陽虛自汗

牡蠣版黃耆 麻黃根錢一浮小麥粒百煎服

此手太陰少陰藥也陳來章曰汗為心之液心有火則汗不止牡蠣浮小麥之鹹涼去煩熱而止汗陽為陰之汗陽氣虛則衛不固黃耆麻黃根之甘溫走肌表而固衛

陰虛
盜汗

柏子仁丸 治陰虛盜汗

柏子仁炒研末人參 白朮 半夏 五味子 牡蠣 麻黃根一兩麥

麩錢五 惠肉丸米飲下五十九日三服

此手足太陰少陰藥也陳來章曰心血虛則之而汗出柏子仁之甘辛

半養心寧神為君牡蠣麥麩之鹹涼靜躁收脫為臣五味酸斂瀉收半

夏和胃燥濕為佐溫能作汗麻黃根掃走肌表引人參白朮以固衛氣為使

茯苓丹

局方

治遺精白濁及強中消渴

心腎為水火之藏法天施地生之道精靈滋載其目遺精育用心過度心不攝腎以致失精者有因思色

慾不遂致精失位輸泄而出者有也慾太過滑泄下禁者亦有年壯氣盛水色慾精滿而泄者亦為病屬有心小腸積火也白濁為氣山脂大腸屬金也又曰赤濁為心虛有熱因思慮而得白濁山脂虛有寒由腎慾而得濁在下消者名虛中腎水動心火亢也

菟絲子

五味子

石蓮肉

白茯苓

山藥

將菟絲用酒浸浸

過餘酒煮山藥糊為丸漏精煎湯下赤濁燈心湯下白濁茯苓湯下消

渴米飲下

此手足少陰藥也菟絲辛甘和平服陰益陽能治精氣淋渴五味滋腎

赤白濁

生津石蓮清心止渴山藥健脾利溼皆滋精固氣之品也茯苓能通心氣于腎利小便而不走氣取其淡滲于補正中能泄腎邪也

治濁固本丸

治胃中濕熱滲入膀胱下濁不止

淋病在溺竅屬肝胆部或由濕熱或由皮寒大抵熱者多而寒者少赤屬血白屬氣或由收精瘀血壅塞竅道痛澀異常非是熱淋不可用淋藥治

蓮

黃柏

益智仁

砂仁

半夏

製茯苓一兩猪苓二兩

草

炙二兩

此足少陰太陽太陰藥也精濁多由濕熱與痰黃連瀉心火黃柏瀉腎火所以清熱二苓所以利濕半夏所以除痰濕熱多由于鬱滯砂仁益

智辛溫利氣又能固腎強脾既以散留滯之氣且少濟連柏之寒甘草

和中而補土惟蓮藕之清則所以固其脫也

朱丹溪曰藥氏原病候論曰白濁者由勞傷腎氣

虛冷故也歷代宗其說不惟白濁之理不問所治之法亦悞不思內經本無白濁之名能言少陰任泉客勝變少陽在泉客勝則溲白又

言思想無窮入房太甚發為白濁與脾熱于腎出白二者皆隨洩而
 下夫非白濁之源乎原病式因舉內經謂諸病水液渾濁皆屬于熱言
 天氣熱則水渾濁寒則清潔可謂發聖人之旨以正千載之誤矣予嘗
 聞先王論赤白濁多因濕熱下流膀胱而成即靈樞所謂中氣不足濕
 便為之變是也必先補中氣使升舉之而後分其藏府氣血赤白虛實
 以治與夫其他邪熱所傷者因在為熱補虛設腎氣虛甚或火熱亢極
 者則不宜過用寒涼之劑必以反佐治之在樞術輕重而已矣葉氏曰
 遺精多作腎虛補益之而罔效不抑此因脾胃濕熱所乘飲酒厚味痰
 火之人多有此疾腎雖藏精其精本于脾胃飲食生化而輸于腎若脾
 胃受傷濕熱內鬱使中氣滯而不清則所輸皆濁氣邪火擾動心不得
 而安靜故

精濁

水陸二仙丹

治遺精白濁

精與兩所出之液不同便濁即是腎淋肝胆
 之火也精濁乃精氣滑出不便亦然此腎水

不足注火蒸蒸
 故精解其位也

金櫻子

取半黃者蒸膏一斤大實一斤蒸
 熟則全甘而失滋味熟寫粉

和九醞酒下

此足少陰藥也金櫻子實其能益精潤能滋陰潛能止脫一生于水二

生于山故名水陸二仙丹

金鎖固精丸

治精滑不禁

精滑者火炎上而水不下心腎不交也

沙苑蒺藜

炒

芡實

蒸

蓮鬚

龍骨

酥土

煨

鹽水

煎一日

一

蓮子粉

為糊

一兩

夜煨粉

一兩

蓮子粉

為糊

一兩

夜煨粉

一兩

蓮子粉

為糊

九菑湯下

此是少陰藥也痰熱補腎益精通子交通心腎壯陽清熱補水芡實固

腎補脾合之蓮鬚龍骨皆潛精秘氣之品以正滑脫也

治遺精大法有五心神浮越者

辰砂磁石龍骨之類鎮之痰飲迷心者猪苓丸之類導之思想傷陰者

潔古珍珠粉九黃柏蛤粉等分滋陰降火思想傷陽者謙而鹿茸養腎

荒線等補陽陰陽俱虛者丹溪作心虛治用珍珠粉丸定志丸補之附

本事猪苓丸猪苓米二兩先將一半炒半夏令黃取半夏為末糊丸更

用猪苓米一半同炒微裂砂銚養之中未間空心酒鹽湯任下釋曰

牛夏育利性猪苓導水益腎閉導氣使通之意也定志丸見目門

人參

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

止氣

虛也

人參

補氣

人參

人參

人參

人參

人參

人參

此手足陽明藥也人參之甘以補其氣枲之苦以燥其濕寒以解其熱瀝以收其脫使虛者補而陷者升亦劫劑也初起用

聖散
桑螵蛸散

治小便數而欠後便頻也欠便短也溺雖出于膀胱然秘別者小腸也小腸虛則便數小腸熱則便

能安神補心氣癢健忘

人參

茯苓

一用

遠志

石菖蒲

桑螵蛸

鹽水

龍骨

龜板

方用錢

用醋

當歸

等分為末臨臥服二錢人參湯下

此足少陰手足太陰藥也虛則便數故以螵蛸龍骨固之

螵蛸補腎龍骨注精

則便欠故以當歸龜板滋之人參補心氣菖蒲開心竅茯苓能通心氣

于腎遠志能通腎氣干心並能清心解熱心者小腸之合也心補則小

腸不虛心清則小腸不熱矣

殺蟲之劑

以爲生者是吾身一小天地也螵蛸人所當有之至倘

其氣 蛇厥

寒受火迫則不安其地亦能為別若飲食不與氣阻虛寒又能變生諸症不可名狀如髮熱驚癇勞瘵傳尸之類至于殺身滅門亟之為患若斯其酷也是以先賢以法授之

烏梅丸

治傷寒厥陰症寒厥吐衄傷寒厥者死藏厥者脈微而厥此厥者故上入陽則煩須臾復止得食則嘔而又煩此間亦治胃府發

咳多而嘔甚則長蟲出亦主久痢
食臭復出也此為藏寒當自生此與烏梅丸滋養安坑

烏梅三百 細辛 桂枝 人參 附子 黃連 乾薑 川椒

去當歸四 苦酒也浸烏梅一宿去核蒸熟和藥蜜丸

此足陽明厥陰藥也虵得酸則伏故以烏梅之酸伏之虵得苦則安故以連柏之苦安之虵因寒而動故以桂附薑椒溫其中藏而以細辛當

歸潤其腎肝人參用以助脾烏梅兼以斂肺吐衄為胃寒之故則安坑

按板柳五分各烏梅九粒邪備日烏梅凡于辛酸入肝藥中飯加苦寒

納上逆之陽邪而順之使下也各日安坑實是安胃故併至久利見陰

五痛

集郊丸三

治暴喘腹痛作止有時或耕起來往

腸痛有作止者重噴則

來者重不
安于胃也

大黃

半

鶴虱

炒

枳榔

訶子

皮

蕪荑

炒

木香

乾薑

炒

附子

七錢

蜜丸食前烏梅湯下婦人醋湯下

此手足陽明藥也重喜溫惡酸而畏苦故用薑附之熱以溫之烏梅訶
皮之酸以伏之大黃枳榔蕪荑鶴虱之苦以緩之木香辛溫以順其氣

五痛

雄黃丸

治腹痛胃痛草痛有時乾痛者不吐不瀉而但痛也有時者淡

雄黃

枳榔

白礬

等分飯丸每五分鐘服

此手足陽明藥也雄黃之辛尋枳榔之苦降胃之酸瀉皆殺虫之品也故合用以治之

假胃

化虫丸

治腸胃諸虫為患

腸胃之中無物不客所以變生諸虫者緣正氣脾衰或與食生虫之物或濕熱蒸鬱而成

事消明必先腐而後虫生之義也

鶴虱

胡粉

法

枳根

東引未

枳根

一

熱

使

君子

錢

五

為米酒煮麵糊作丸量人大小服之一歲兒五分

此手足陽明藥也數藥皆殺虫之品也單用尚可治之類聚為丸而重

焉有不死者乎

與鶴虱日古方殺虫如雷九貫象乾漆瑱瑱百部鉛灰之類皆其所常用者也有加附子乾薑者壯正氣也加

苦參黃連者虫得苦而伏也加烏梅訶子者虫得三而飲也加蘇大瓜者欲其帶虫吐也加用花黑丑者欲其帶虫瀉下也用雄黃川椒蛇床樟腦水銀枳榔者治瘡疥之虫是用胡桐淚黃若子並子蟾酥者治諸齒之虫也用川神皮海桐皮者治風癢之虫也用青箱子覆盆菜

者治九竅天饒之虫也用敗鼓心龍符飯也

真骨死人悅順

瓜

鴉

首

者

驅

勞

察

之

虫

也

使

子

丸

八

重積

使君子丸

治蠱脹腹痛及食穀不化食米炭土等物

飲食停滯濕熱蒸鬱則主

諸虫至服清痛或發黃身腫喜食生米茶葉土炭者重之所著也

使君子

去殼

南星 麝 枳 榔

一兩

右藥合炒如薑食生米用麥芽一斤炒

喜食茶葉用茶葉炒喜食炭土用炭土炒取藥為末蜜丸每晨沙糖水

下

此手足陽明藥也使君子之甘南星之毒枳榔之苦皆能殺虫炒以諸物因其所嗜引以砂糖誘之以甘也

傳尸 勞虫

獺肝丸

後用

治鬼疰傳尸勞瘵

此五疰之一其症使人寒熱沉沈默默不

獺肝

一具須從狗身取下不爾多傷

陰乾為末水服二錢日三次

此三陰藥也其鶴臯曰獺肝治鬼疰此何以故凡物惡人而僻處晝伏而定出者皆陰類也故假之以治陰疾獨用其肝者肝為厥陰藏魂之

藏也謂按物之惡人解虛書伏夜出者狐鼠皆然不獨獼也本草玉諸
肝皆有葉數惟期肝一月一葉其間又有退葉獨著于他賦此其
所以能治
鬼症也歟

消渴

消渴殺虫方

治消渴有虫

昔棟根 取新白皮一握切焙入麝香少許煎空心服雖困頓不勿取

下虫三四條類虬而色紅其渴乃止

此陽明藥也消渴一症有虫耗其精液而成者益飲醇食炙積成胃熱

濕熱生虫理固有之臨病宜諦審也

明目之劑

目之在人特五官之一耳而古人立有專利蓋以餘數各

注于目而為之精精之氣為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之

精為絡氣之精為白眼肉之精為約束裏膜筋骨氣血之精而與脉

并為系上屬于腦後出于項中此則眼具五藏六府也故其症多而

方亦廣茲乘限于篇章故畧錄專治目疾者數方以備揀用其疏風
燥濕瀉火養血之劑可以通用者則散見于各門。目有五輪日精
為氣輪屬肺金故獨堅膏睛為風輪屬肝木內包膏汁涵養瞳神目

開陽
滋陰

滋陰地黃丸

一名熟地

治血弱氣虛

不能養心

心火旺盛

肝木自實

肝木自實

肝木自實

肝木自實

子散大視物不清

肝為心母

子能令母

實故心火

旺則肝木

作實肝主

火則清和之氣

乘亂而精液隨之

走散矣精液走則光華失故視物不清

火則清和之氣

乘亂而精液隨之

走散矣精液走則光華失故視物不清

走散矣精液走則光華失故視物不清

走散矣精液走則光華失故視物不清

走散矣精液走則光華失故視物不清

走散矣精液走則光華失故視物不清

走散矣精液走則光華失故視物不清

走散矣精液走則光華失故視物不清

風熱從此道上攻頭目致偏頭痛腫脹子散大視物皆

花血虛陰弱故也宜涼血養血散火散火而除風熱

花血虛陰弱故也宜涼血養血散火散火而除風熱

花血虛陰弱故也宜涼血養血散火散火而除風熱

花血虛陰弱故也宜涼血養血散火散火而除風熱

花血虛陰弱故也宜涼血養血散火散火而除風熱

花血虛陰弱故也宜涼血養血散火散火而除風熱

花血虛陰弱故也宜涼血養血散火散火而除風熱

花血虛陰弱故也宜涼血養血散火散火而除風熱

熟地黃

生地黃

方七錢半

柴胡

錢八

黃芩

炒酒歸

五錢

天門冬

地

地

骨皮

五味子

黃連

酒炒人參

甘草

炙枳殼

二錢

熟九茶清下

熟九茶清下

熟九茶清下

熟九茶清下

補肝腎

曰二服忌食辛熱之物助火寒冷之物損胃便藥不上行

此手足少陰足厥陰少陽藥也熟地當歸養血生肌地骨涼血黃芩瀉

肺火黃連瀉肝火天冬清肺而滋腎柴胡散肝而升陽五味收耗而斂

散人參甘草以益氣補中枳殼以利氣行滯也

加減駐景丸易治肝腎氣虛兩目昏暗目為肝竅厥子神光皆腎故肝腎虛則目昏暗也

枸杞子 五味子 車前子妙二 楮實 川椒妙一 熟地黃 當歸五

莧絲子八兩酒浸 蜜丸酒下本方除當歸五味楮實川椒名駐景丸治同

此足少陰厥陰藥也熟地枸杞補肝滋腎莧絲楮實益精強陰五味斂

耗散而助金水五味子酸鹹居多能斂肺金滋腎水收瞳人散大 當歸和氣血而益肝脾肝藏

統血目得血而能視 川椒補火以逐下焦虛寒車前利水而瀉肝腎邪熱也車前

肝明目利小便而不走氣得此瀉邪則補藥便為得方張

子和曰目赤腫是厥陰肝經風熱利小便能去肝經風熱

不能遠視

定志丸

方

治目不能遠視能近視者

王海藏曰目能近視責其有水不能遠視責其無火法宜補心

常

服益心強志能療健忘

遠志

菖蒲

二兩

人參

茯苓

一兩

蜜丸硃砂為衣張子和方無菖蒲

加茯神相子仁酸枣仁亦名定志丸酒糊丸薑湯下安魂定驚

此手少陰藥也人參補心氣菖蒲開心竅茯苓能交心氣于腎遠志能

通腎氣于心硃砂色赤清肝鎮心心屬離火火旺則光能及遠也

不能近視

地芝丸

東垣

治目能遠視不能近視

王海藏曰目能遠視責其有火不能近視責其無水法當補腎

生地黃

焙

天冬

四兩

枳殼

炒

甘菊花

去蒂

二兩

蜜丸茶清或酒下

用茶者飲火熱之下

降用酒者飲藥力之上行

此足少陰藥也生地涼血生血天冬潤肺滋腎枳殼寬腸去滯甘菊降

火除風

內障

人參益胃湯

治勞役飲食不節內障自病

內障者睛裏昏翳與不病之

白者李東垣曰五藏六府之精氣皆稟受于脾胃而上貫于目脾者諸陰之首也目者血氣之宗也故脾虛則五藏之精氣皆失所司不能歸明于目矣心者君火也主神宜靜而安相火代行其令相火者胞絡也主百脉皆勞于目既勞役運動勞力故行及因邪氣所并而損其血脉故諸病生焉醫者不理胃及養血安神治標不治本不明理也

黃耆

人參

兩一甘草錢

白芍藥

炒黃耆

和

酒炒四錢

蔓荊子

錢

每四錢

日二服本方加升麻葛根各益氣聰明湯

補門

此足太陰陽明藥也參耆甘草大補中氣以強脾胃蔓荊升清陽而通

九竅白芍入厥陰而和榮血

目得而視

黃耆相除濕熱而滋腎水

腎水走則目明使

精氣足而清陽升則藏府和而障翳退矣

損金善曰治目不明氣虛而求脫可于參耆中微加連相

音氣已脫連相等

傷症

治風熱血湯

治目赤腫痛

風熱傷而則赤風熱作實則腫風熱攻注則

痛目赤向外向內皆為外皆在內近鼻者為內

赤腫

治目赤腫痛

風熱傷而則赤風熱作實則腫風熱攻注則

痛目赤向外向內皆為外皆在內近鼻者為內

痛目赤向外向內皆為外皆在內近鼻者為內

昔上為外皆下為內皆自痛赤脉從上下者為太陽症宜溫之散之
從下上者為陽明症宜寒之下之從外走內者為少陽症宜和解之

荆芥 蔓荊子 菊花 白芷 麻黃 防風 桃仁去皮 桑花炒 川

芎藭 當歸 白芍 炒 草決明 石決明 甘草錢一

此足太陽厥陰藥也荆芥防風麻黃白芷甘菊蔓荊輕浮上升並能瀉

風散熱桃仁紅花川芎歸芍辛散酸收並能養血去瘀兩決明皆除肝

經風熱專治目疾瘀去血活則腫消風散熱除則痛止又目為肝竅搜

風養血皆以和肝加甘草者亦以緩肝而止痛也保命集云目病在府則為表常除風散熱

在表則為裏常養血安神暴發者為表易象久病者在裏難治

洗肝散方 治風毒上攻暴作赤腫目痛難開隱瞢淚淚凡目赤者或大府秘脉實有力

者為有裏論宜微利之瀉青丸洗肝散之類是也散音為眼脂

薄荷 羌活 防風 當歸 川芎 梔子 大黃 炙甘草 等分

爲末每服二錢無裏症者除
梔子大黃

此足厥陰陽明藥也肝屬木而主目木喜條達風熱鬱于內故用薄荷

羌防以升之散之肝藏血故用當歸川芎以和之養之大黃瀉胃火而

通燥結梔子降心火而利小便二便利則熱毒
下降而赤腫消甘草緩肝氣而和中州

除症
目痛
補用散方局
治肝虛目痛筋脉疼痛冷淚不止羞明怕目及夜則刺甚黑

苦寒之藥反劇者目白珠傷陽白珠痛者則盡其
黑珠傷陰黑珠痛者則夜甚

夏枯草五錢香附一兩每服五錢臘茶下并溪方夏枯草香附各二兩加

甘草五錢

此足厥陰藥也夏枯草遇夏至陰生則枯蓋稟純陽之氣有補養厥陰

血脉之功夜痛及用苦寒藥反甚者夜與寒皆陰也夏枯草能治之者

陽勝陰也香附行氣散肝和中解鬱推陳致新故用以爲佐

此方見于
醫方類聚
卷之九

風熱
證弱

撥雲退翳丸

治風熱障翳弱膜有氣血虛實或痰或瘀

治風熱障翳弱膜有氣血虛實或痰或瘀

當歸

地骨皮

白茯苓

蜜蒙花

甘菊花

羌活

荆芥

木賊

天花粉

蔓荊子

薄荷

枳實

甘草

連蛇蛻

蟬蛻

蜜丸每兩作十丸每服一丸日三服者米泔下

膚暗當歸湯下內障水香湯下

此足太陽厥陰藥也羌活荆芥蔓荊薄荷以升陽散風當歸川芎以和

肝養血黃連地骨花粉清火熱枳實破滯氣川椒溫下焦木賊蛇蛻蟬

蛻以退翳蜜蒙花蔡甘菊目蒙翳藥以潤肝補腎瀉火清金炙草補中

以和諸藥也

一切

石膏羌活散

治人患雙目不明遠年近日內外氣障風昏拳毛倒睫

一切目疾

李時
毛

羌活 荆芥 白芷 藁本 細辛 川芎 蒼朮 甘菊 蜜蒙花

萊子 麻子 木賊 黃芩 石膏 甘草 等分爲末每服一二

錢食後臨臥蜜水調下或茶清米泔亦得

此足太陽陽明厥陰藥也原文曰羌活治腦熱頭風藁本治正偏頭痛

白芷清頭目川芎療頭風荆芥治目中生瘡蜜蒙治羞明怕日蒼朮明

目煖水藏木賊退障翳麻子起拳毛細辛萊子起倒睫黃芩石膏洗心

退熱甘菊降火除風甘草調和諸藥

防風飲子 治倒睫拳毛制曉拳毛由目急皮縮之故也蓋伏熱內攻陰

出立

黃連炒 甘草炙 人參錢一 當歸錢半 葛根 防風分五 細辛 蔓荊子分三 食

後服避風寒濕熱

內障

此足太陰陽明藥也參甘以補其氣歸身以濡其血黃連以清其火防

葛以散風熱細辛入少陰而潤腎蔓荊走頭面升陽

本方除人參當歸黃連加黃耆名神効明目湯東垣治前症兼赤爛昏痛

冷淚多眵

又法摘去拳毛以鼠血點數次即愈

羊肝丸類

治目疾內障

倪仲賢曰經曰心者五藏之專精目者其竅也又為肝竅腎主骨骨之精為神水故肝木不平

內熱心火為勢妄行火炎不制神水受傷上為內障此五藏病也諸脈皆屬于目相火者心包絡也至百脈上榮于目火盛則百脈沸騰上為內障此虛陽病也勝脫小腸三焦肝脈俱循于目其精氣亦上注于目之精四府一衰則精氣盡敗邪火乘之上為內障此六府病也神水黑眼皆發于陰白眼赤脈皆發于陽除腎陽作夜能為視發微不立陽虛即淫經口壯火食氣壯火散氣上為內障此弱陰病也四者皆為陰陽不能配陽也

夜明砂

同蟬蛻

木賊去當歸一兩

洗羊肝四兩煮

以羊肝去筋膜水

煮搗爛和丸

此足厥陰藥也蚊食血之虫夜明砂皆收服也故能散目中惡血而明

目化其失為夜明砂水賊輕揚而親膠木液能平肝散熱而去障蟬性

善蛻故能退翳當歸能入厥陰養血而和肝用羊肝者羊性屬火取其

氣血之屬能補氣血引諸藥入肝以成功也羊肝尤之方眼者

濟生羊肝丸西述一兩搗羊肝一具去筋膜生甲搗爛和丸本方者

爛搗用治肝經有熱目赤腫痛及內障青盲綱目云但足目疾及障翳

要金書曰誠哉河間之言目盲耳聾鼻不聞臭舌不知味手足不能運

用者皆肝立府閉塞而神氣出入升降之道路不通利也故先賢治目

皆化如羊肝用羊肝引黃連等藥入肝解肝中諸毒蓋肝主目肝熱

解則目之安府通利而明矣黃連之類解熱藥也椒目之類解濕熱也

羌活之類解氣鬱也芎藭之類解血鬱也木賊之類解積鬱也羌活之

經曰
立府
者肝
空也
憂苦
十蒸
為米

京垣丹溪用參

氣血亦能明者蓋目主氣血盛則

光矣焉

味氣能膏

出入

亦可
服或
即入
藥中

吞
入服

赤
流淚

升降而明虛則玄府無以出入升降而皆此
則必用藥者四物等劑助氣血運行而明也

鬼矢湯 治瘡疹八眼及昏暗障翳

鬼矢二錢 茶清調下或吞服須待瘡疹瘳後服之

此足厥陰陽明藥也鬼者明月之精得金之氣其矢名明月砂能解毒
殺虫故能明目又可兼治榮府也

三百味草花膏 治目赤流淚或痛或痒晝不能視夜惡燈光血熱則

熱則多淚熱淚則痛然其則痛赤腫
昏眵於晝不能視陽勝故夜惡火光

羯羊膽 蜂蜜 入蜜膽中蒸熟候乾細研為膏每合少許或照目中

又法臘月入蜜膽中紙籠養生懸屋簷下待霜出搗取照眼

此足少陽厥陰藥也羊胆苦寒益胆瀉熱蜂蜜甘潤補中緩肝曰二百

味草花膏者以羊食百草蜂採百花也李時珍曰肝開竅于目肝汁減
則目暗肝者肝之外候胆之府

弱症
內疾

點眼方

治目
中百病
症者

此也故諸眼皆治目疾點眼說云病有內外治各不同內疾既發非服
不除外疾既成非點不退內疾始盛治氣不如點伐枝不如去根不
服藥而除者未之見也外障既成如物汚須濯洗垢須磨不點而去者
未之有也若內障不服而外點反激其火動其血氣無益反損若外障
已成雖服藥不發不長而所結
不除當內外夾攻方盡其妙

黃連 人乳 浸點或煎點或加朴硝

此足厥陰藥也衍義曰人心主血肝藏血目受血而能視熱水入于經
其血乃成又曰上則為乳汁下則為月水故知乳汁即血也用以點目
豈有不相宜者哉昂按加黃連者以清心肝之火也

百照膏
治翳遮瞳人如雲氣障隔

黃連 二錢以水一碗煎
至半碗再入後藥當歸 甘草六分防風八分麝仁沙三分一同熬滴

水不散去渣入蜜少許再煎少時要病人淨心點之至目微痛為度一

外障
百照膏
治翳遮瞳人如雲氣障隔
黃連 二錢以水一碗煎
至半碗再入後藥當歸 甘草六分防風八分麝仁沙三分一同熬滴
水不散去渣入蜜少許再煎少時要病人淨心點之至目微痛為度一

曰五七點使藥力相續故曰百點臨卧點尤妙

此足厥陰藥也黃連瀉火防風散風甘草和中當歸養血麤仁消風散

熱益水生光

內障

圓明膏

治內障生翳及瞳子散大因勞心過度飲食失節

柴胡 麻黃 黃連 生地 錢五 歸身 錢三 甘草 訶子皮 錢二 以水

二碗先煮麻黃至一碗去沫入後藥同煮至水不散去渣入蜜少許

再熬點之

此足少陽厥陰藥也柴胡麻黃發表散邪當歸生地和肝養血黃連清

肝火甘草和中州瞳子散大故加訶子以收之也

人目

飛絲芒塵入目方

陳璧 濃磨點之

清毒散

真人活命飲

治一切癰疽腫毒初起未消者

癰瘍之病，行氣行血，外相並周，流寒與熱，搏之則凝，滯而行，遂為不通。氣得邪而凝，津液稠結，為痰為熱，久滯入脈，中氣為之滯，此陰滯于陽也。血得邪而凝，遂為癰疽，此陽滯于陰也。百病皆由于此。若不早治，則入於骨髓，不可救矣。此藥專治一切癰疽腫毒，初起未消者，服之立見奇效。其方用：金銀花二錢，陳皮一錢，白芷一錢，甘草一錢，貝母一錢，天花粉一錢，乳香一錢，沒藥一錢，皂角刺一錢，穿山甲一錢，山甲粉一錢，用酒煎服。此藥專治一切癰疽腫毒，初起未消者，服之立見奇效。其方用：金銀花二錢，陳皮一錢，白芷一錢，甘草一錢，貝母一錢，天花粉一錢，乳香一錢，沒藥一錢，皂角刺一錢，穿山甲一錢，山甲粉一錢，用酒煎服。

金銀花

二錢

陳皮

一錢

白芷

一錢

甘草

一錢

貝母

一錢

天花粉

一錢

乳香

一錢

沒藥

一錢

皂角刺

一錢

穿山甲

一錢

山甲粉

一錢

用酒煎服

此藥專治一切癰疽腫毒，初起未消者，服之立見奇效。其方用：金銀花二錢，陳皮一錢，白芷一錢，甘草一錢，貝母一錢，天花粉一錢，乳香一錢，沒藥一錢，皂角刺一錢，穿山甲一錢，山甲粉一錢，用酒煎服。

毒在上飽服在下飢服善飲者多飲酒以行藥勢忌酸物鐵器

此足陽明厥陰藥也

金銀花散熱解毒癰疽聖藥或以為君花粉清痰

降火自芷除濕祛風並能祛膿消腫歸和陰而活血陳皮燥濕而行
 氣防風瀉肺疏肝貝母利痰散結甘草化毒和中故以為臣乳香胡氣
 托裏護心能使毒氣外出不致內攻沒藥散瘀消腫定痛故以為佐穿山甲善走能
 散皂角刺辛散剽銳皆厥陰陽明正藥能貫穿經絡直達病所而潰壅
 破堅故以為使加酒者欲其通行週身使無邪不散也此藥常服于未潰之前
 散已成者清苦已潰後不可服

初起

金銀花酒

治一切癰疽惡瘡不問發在何處或肺癰腸癰初起便服奇
 效

癰疽之生由于喜怒憂樂之不時飲食居處之不節或金乃草藥之
 功發動寒暑燥濕之不同致陰陽下平而毒結聚而發潰而為瘡者
 起于六腑清遠而為癰重者發于五臟深清而為疽淺者為疔實者為
 癰深明為疔矣。發于外者為疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔
 肺癰腸癰等病外發易識內症難明太陽經虛從背而出少
 陽經虛從髯而出陽明經虛從鼻而出督脈經虛從腦而出

金銀花

五兩重者亦可
 不及生者力速

甘草一兩
 水二碗煎一碗再入酒一碗罌煎分

三服一日一夜服盡重者日二劑服至大小腸通利則藥力到外以生
者搗爛酒調敷奇四

此足太陰陽明藥也金銀花寒能清熱解毒甘能養血補虛為癰瘡聖
藥甘草亦扶胃解毒之上劑也

本方用金銀花二兩甘草四兩加黃耆三兩酒一升重湯煮服名回毒金銀花

湯治痛癢色變紫黑者

附忍冬膏金銀花一兩四月採鮮花搗汁熬膏茶酒化點服養陰退陽補

虛療風尤宜于火熱熾盛之人永無疔疽之患皆酒亦佳花葉同功而

花香尤勝

托裏

蠟藥丸

治一切瘡癰惡毒先服此丸護膜托裏使毒不攻心或為毒

正蛇犬所傷並宜服之

等分

金銀花酒

蠟藥丸

托裏散

三

黃蠟二兩白礬一兩先將蠟溶化候少冷入礬和勻為丸酒下每服十九
二十九漸加至百丸則有力瘡愈後服之亦佳加雄黃名雄礬丸治蠱
毒蛇犬虫咬毒

此足少陰藥也心為君主不易受邪凡患癰疽及蛇犬所傷毒上攻心
則命立傾矣黃蠟甘溫白礬酸澁並能固膜護心解毒定痛托裏排膿
使毒氣不致內攻故為患諸症者所必用也

托裏

散

治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脉洪實腫甚欲作膿者

脉強洪實數乃實熱
堅前之症故宜下之

金銀花 當歸 大黃 朴硝 花粉 連翹 牡蠣 皂角刺 三黃

苓 赤芍 每五錢半酒半水煎

此足陽明厥陰藥也金銀花清熱解毒瘡腫主藥當歸赤芍調榮血太

少陽明經

救苦勝靈丹

一名救苦化

治瘰癧馬刀挾癭從耳下或耳後下頸至

肩或入缺盆中乃手足少陽經分其瘰癧在頸下或至頰車乃足陽明

經分受心脾之邪而作也今將三症含而治之

黃耆黃耆主血生肌散生肌散能散諸經血漏蘆漏蘆升麻各一

葛根葛根五分升麻升麻各一生肌散生肌散能散諸經血漏蘆漏蘆升麻各一

白芍藥白芍藥各三分生肌散生肌散能散諸經血漏蘆漏蘆升麻各一

必用之必用之夏月倍之冬寒則不可用防風防風羌活獨活各一錢

黃芩硝湯胃熱黃芩清肺火牡蠣軟堅痰連翹花粉散結排膿角刺鋒

銳直達病所而潰散之也李東垣曰瘡瘍及諸病而赤雖伏火熱禁不

之故曰火鬱則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加

潤燥藥以潤之如見風脈風症其宜發表風藥便可以通利大便若上

乾燥秘情尤宜潤之慎不可下九竅不利瘡瘍皆胃皆不可下汗之則

愈則目曰大便秘實不知其氣不降也便以爲實而行大黃些少寒熱

不知其血氣不和也便以爲有

外感而行表散如此害人甚速

治瘰癧馬刀挾癭從耳下或耳後下頸至

肩或入缺盆中乃手足少陽經分其瘰癧在頸下或至頰車乃足陽明

經分受心脾之邪而作也今將三症含而治之

黃耆黃耆主血生肌散生肌散能散諸經血漏蘆漏蘆升麻各一

關手足太陽症脊痛項強腰似折真似振者用之防風辛溫若發在
膈已上雖無太陽症亦當用之為能散上部風邪去病人拘急也 柴

胡不在少陽經去之 鼠粘子 解毒無 人參 短各三分補肺氣加氣甘草

炙五分能調中和諸藥 肉桂 二分能散結積陰症瘡瘍當少用之此寒

濕火益胃氣亦去毒邪 黃連 以去 黃柏 炒各三分如有熱或腿脚無力加之如

氣煩燥者去之 三稜 煨微飲去衣者腎中伏火也便宜加之

無此 昆布 三分鹹能軟堅 三稜 煨其者用之不堅不用 益智 分

唾多者胃不和也病人 麥芽 一錢治腸中結神曲 炒能厚朴 一錢二分

吐沫吐食胃寒者加之 蒸餅為丸每服三錢如氣不順加陳皮木香大便不通加酒製

勿用 大黃血燥加桃仁大黃風燥加麻仁大黃秦茺皂角子 煨

此足陽明手足少陽藥也解熱東垣註各藥下東垣立此法以聽用者

之進退倘能隨症加減實能統治諸病亦加惠後人無窮之心也

消堅散腫湯 治同前症

黃芩八錢半酒洗知母炒黃柏炒胆草酒洗花柳炒桔梗昆布五錢柴胡四錢

升麻連翹甘草炙三稜酒洗廣藨酒洗葛根歸尾酒洗芍藥二錢黃

連一每服六七錢先浸半日煎食後熱服服後仰臥取藥在上膈另

將半料蜜丸留藥湯吞之量虛實服

此手足少陽足陽明藥也柴胡連翹清熱散結升麻葛根解毒升陽花

粉桔梗清肺排膿歸尾芍藥潤肝活血甘草和中化毒昆布散痰潰堅

三稜莪朮破血行氣三稜破血中之氣莪朮破氣中之血黃芩和連龍胆知母大瀉三焦

之火而桔梗又能載諸藥而上行也

以毒飛龍奪命丹治一切片腫癰疽惡瘡初發或發而黑陷毒氣內攻者

天南星雄黃巴豆去油黃丹乳香礞砂信石五錢斑猫十六

研足麝香許為末酒和為丸如麥米大每服十九或十四五丸量

此藥集解卷之八
藥錄卷之八
此藥集解卷之八
藥錄卷之八

人儘當好酒送下瘡在上者食後服瘡在下者食前服忌油膩魚肉葷辛之物

此十二經通行之藥也毒氣內攻瘡瘍黑陷非平劑所能勝南星雄黃

黃丹味辛性燥能殺毒破痰巴豆礪砂大毒大熱能祛寒化積致猶蟬

酥辛寒至毒能拔疔腫下惡物玩箭能湯毒從小便止信石燥烈劫痰

辟香香竅通乳香能使毒氣外出不致內攻引之以酒使行經絡無

毒不瀉也此乃風劑所謂藥不瞑眩厥疾不瘳此類是也王機微義曰此方世俗多

用之然香竅燥毒之劑蓋無經不至者備註吐下三法病因食一切禽

獸及瘡脈沉細紫黑者熱在裏非溫毒用之神効若大熱大渴毒

氣發發脈浮洪在表及音聲壯熱之人不宜輕用世人多不分此又有

以牛夏代雄黃者殊不知雄黃治諸瘡及百箇中大風中惡者之意也

以病之而經在君相二主喉主天氣尾肺金變動為燥七則清而閉咽

雄黃解毒丸

治喉急

喉急

喉急

于咽喉腫達于外麻痺且痛
為喉風腫于兩旁為喉痺

雄黃一錢 金二錢 巴豆十四粒
去皮油

醋糊為丸每服五分津嚥下
或用巴豆

上燃火吹息帶烟刺入喉中出紫血惡
涎即寬此以熱攻熱七則流通之義也

此手足少陰少陽藥也吳鶴皋曰纏喉急痺緩治則死維黃能破精氣

鬱金能散惡血巴豆能下稠涎丹溪生平不用劇劑此蓋不得已而惟

者乎單蟻製織木舌子舌脹纏喉風走馬喉風病同于火故不分也惟

火鬱發之發謂發汗出血者乃發汗之一端也

皂莢丸金治肺癰欬逆上氣時時唾濁但坐不眠肺者五藏之華蓋也

皮毛芳傷血氣膜理虛而風邪乘之內感于肺汗出惡風咳嗽短氣鼻

塞項強胸膈脹滿久久不瘳則成肺癰傷皮毛熱傷血脈風熱相搏

氣血積留結于肺則成肺癰冬唾涎沫而無膿者肺痿也口乾喘滿

癰為邪氣實

皂莢

同去皮

為末蜜丸以蜜膏和湯服三丸

此手太陰藥也喻嘉言曰火熱之毒結聚于肺表之裏之溫之清之會不少應堅而不可攻者今服此丸庶幾無堅不八聿成洗滌之功不可以藥之微賤而少之也

千金方用桂枝湯去芍藥加皂角名桂枝去芍藥加皂角湯治肺痿吐

沫本方加蛤粉等分為末名皂蛤丸治婦人風邪客于乳房而成奶癰

每服二錢酒下

此藥能導其汗散其風邪汗出而病自愈矣

解表托裏

托裏

十補散

局方即外科精要十宣散

治癰瘡初發或已發邪高痛下瘡盛形羸脉

無力者

若癰疽不因音梁升毒火熱因虛勞氣鬱者宜宜補形氣謂經脈自當消散不待汗之下之也

黃耆

人參

當歸

川芎

桂心

白芷

防風

厚朴

桔梗

甘草

每服二錢加至六錢熱酒調下本方加芍藥連翹木香乳香

沒藥亦名托裏散治癰疽疔瘡

此手足太陽足厥 陽明藥也參耆補氣歸酒血甘草解毒桂枝白

芷桔梗排膿厚朴瀉實蒲防風散風邪為表裏氣血之藥共成助陽內

托之功也朱升溪曰若冬月肺癰用之可轉重就輕若潰瘍夏月用之

人不分冬夏無論經絡不能無誤也概要曰治瘡須明托裏疎通藏府

謂和榮衛三法內之外者其脉沉實發熱煩躁外無欬赤痛深于內其

邪深矣當疎通藏府以絕其源外之內者其脉浮數欬腫在外形症外

宜通知其在經當和榮衛用此三者雖末即應必無變症

潰後補虛

托裏黃耆湯

治諸瘡潰後膿多內虛潰後膿血出多陰陽兩竭宜大補氣血

黃耆 人參 當歸 桂心 茯苓 遠志 麥冬 五味子 炒 等

分每服五錢食遠服

此手足太陽足陽明藥也人參黃耆補氣固衛當歸桂心清血生肌扶

艾溲濕健脾麥冬清熱補肺遠志辛散治理癰疽散鬱補精長肌肉助筋骨五味酸溫善收腫大丹溪曰癰疽潰後補氣血理脾胃實為切要否則數月半

瘡瘍內陷

年之後虛症仍見轉成他病也
托裏溫中散孫彥和治瘡瘍為寒變而內陷膿出清解皮膚涼心下痞滿

腸鳴切痛大便微澀食則嘔逆氣短呃逆不得安卧時發昏憤此孫彥和治王

伯祿背痠方也六脈沉微色紫膚涼加以呃逆胃中虛寒

附子炮四錢乾薑炮三錢羌活三錢木香半錢茴香丁香沉香益智仁陳

皮甘草錢一加生薑五片煎

此足陽明三陽藥也衛生寶鑑曰經因寒淫于內治以辛熱佐以苦溫

附子乾薑大辛熱溫中外發陽氣曰寒之表為君羌活味苦辛溫透關

節炙甘草溫補脾胃行經絡通血脉胃寒則嘔吐呃逆不下食益和沉

香丁香大辛熱以散寒邪為佐瘡氣內攻聚而為浦木香茴香陳皮辛

溫治痞散滿為使

止痛

止痛歸湯

治腦疽背疽穿潰瘰癧

當歸 生地黃

芍藥 黃耆

人參

甘草

官桂

此足陽明厥陰藥也當歸生地活血涼血人參黃耆益氣補中官桂解

毒化膜

則痛漸止

芍藥和脾酸以斂之甘草扶胃甘以緩之則痛自滅

矣

齊德之曰世人皆謂乳沒珍貴之藥不任疼痛不知臨病制宜殊非

近之虛痛補之實痛瀉之膿鬱而閉者開之惡肉收潰者引之陰陽不和者調之經絡閉澁者利之不可執一而無權也

鐵落
長肉

生肌散

斂瘡長肉

者禁之

寒水石

煨

滑石

龍骨

海螵蛸

蜜陀僧

枯礬

定粉

乾胆

脂錢

共為細末搽瘡口上

瘡口

止痛

生肌

散

瘡

口

此陽明藥也

陽明主肌肉

瘡口不斂蓋因膿水散溢而潰爛也石膏

亦名寒水石李

時珍曰唐宋諸方寒水石即石膏

滑石解肌熱龍骨枯礬善收滴胭脂活血解毒蜈蚣

陀僧定粉收濕燥膿故能斂瘡而生肉也

又方檳榔枯凡

各一兩

陀僧黃丹血竭

各一錢

輕粉

分五

亦名生肌散張子和

方黃連

三錢

蜜陀僧

五錢

胭脂豆粉

各二錢

雄黃輕粉

各一錢

亦名生肌散治同

灸法 治一切癰疽惡瘡

凡人初覺發背欲結未結赤腫炊痛以濕紙覆其上先乾處即癰頭也

取獨頭大蒜切片安于頭上用艾炙之三壯換一蒜片痛者炙至不痛

不痛者炙至痛時方佳最要早覺早炙為上若有十數頭者即用蒜研

作餅鋪頭上聚艾于頭上燒之若初發赤腫一片中間有黃粟米頭子

便用獨蒜片安于頭上着艾炙十四壯或四十九壯使毒氣外出則易

雄
寒
傷
寒

芙蓉外敷法

愈李時珍曰通腫用芙蓉子用藥三壯一易百壯為率但頭項以上初不可用恐引氣上更生大禍也更源曰有灸至八百壯者約艾一條初
裏肉不痛而炙至好肉方痛至夜火熾諸皆高卓頭孔百數則毒外出
否則內通五藏而危矣綱目曰精要謂頭上發毒不得灸此言過矣頃
為醫陽所聚艾炷宜小壯數宜少小者如椒粒少者三五壯而已按東
垣灸元好問腫疽以大艾炷如兩核許者灸至百壯始覺痛而痊由是
推之則頭上發毒灸之痛者艾炷宜小壯數
自少若不痛者艾炷大壯數多亦無妨也

一切癰疽腫毒用芙蓉花或葉或根皮爛搗或乾研末蜜調塗四圍中
間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿出已潰者
則易放湯醫秘之名為清涼膏清露散鐵箍散皆此物也或加赤小豆
末或耳燒存性為末加入亦妙芙蓉辛平性滑通結清膿涼血散熱止痛消腫排膿

經產之劑

婦人之病與男子同惟行經雄脈則不可以例治故取胎

表實六合湯

藏海

治妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈緊太陽經病

醫方集解

卷六

芙蓉外敷法

表實六合湯

三

四物湯

四兩每味一兩麻黃

細辛五錢

此足太陽藥也凡婦人傷寒六經治例皆同有懷妊者則以安胎為主藥中有犯胎者則不可用也海藏皆以四物爲君養血安胎餘同傷寒例分症而治麻黃細辛發汗解表故加用之治表實無汗者

四物四兩加桂枝地骨皮各七錢名表虛六合湯治妊娠傷寒表虛自

汗身熱惡寒頭痛項強脉浮而弱

地骨皮涼血故能退熱止汗

四物四兩加防風蒼

朮各七錢名風濕六合湯治妊娠傷寒中風濕氣肢節煩痛頭痛身熱

脉浮四物四兩加升麻連翹各七錢各升麻六合湯治妊娠傷寒下後

過經不愈濕毒發斑如錦紋者四物四兩加柴胡黃芩各七錢名柴胡

六合湯治妊娠傷寒胸脇滿病而脉弦少陽經症四物四兩加大黃五

錢桃仁十枚麩炒名大黃六合湯治妊娠傷寒大便秘小便赤氣滿而

脉沉數太陽陽明本病也急下之雄黃桃仁如婦人忌然傷寒問有明之者謂藥病相當也經曰婦人正身

毒之如何蛇伯日有故無四物四兩加人參五味各五錢各人參六合

湯治妊娠傷寒汗下後咳嗽不止四物四兩加厚朴枳實麩炒各五錢

名朴實六合湯治妊娠傷寒後虛痞脹滿陽明本虛者本胃也四物四兩

加梔子黃芩各五錢名梔子六合湯治妊娠傷寒汗下後不得眠四物

四兩加石膏知母各五錢名石膏六合湯治妊娠傷寒大渴而煩脉長

而大四物四兩如茯苓澤瀉各五錢名茯苓六合湯治妊娠傷寒小便

不利太陽本病本膀胱四物四兩加阿膠芩葉各五錢名阿艾四物湯

一方加甘草一方治妊娠傷寒汗下後血漏不止損動胎氣者四物四

兩加附子肉桂各五錢名附子六合湯治妊娠傷寒四肢拘急身涼微

汗腹中痛脉沉遲者少陰病也在附亦辛熱助胎之藥四物四兩加生

抵當 湯桃 仁承 氣湯 汗治 蓄血

牛膝 漏下

地大黃酒各五錢各四物大黃湯治妊娠傷寒育血症歌曰婦人妊娠

仁莫妄施要致母子俱無損大黃四物對分之吳緩日產後傷寒不可
輕易發汗蓋有產時傷力發熱有去血過多發熱有惡露不盡發熱有
三日乳蒸發熱或早起勞動飲食停滯亦皆發熱狀類傷寒要須詳辨
大抵產後大血虛非汗之則變筋惕肉瞤或昏迷不醒或抽搐不定
或大便閉塞其害非輕凡有發熱且與四物湯芎歸為君最冬白芍須
妙過酒蒸熟地黃佐之加軟苗柴胡乾薑人參主之最効蓋乾薑辛熱
能引血藥入血分氣藥人氣分且能去惡生新有陽生陰長之道以熱
治熱深合內經之旨如惡露不盡者益母丸黑神丸必兼用之胃虛食
少者加百本茯苓有痰阻逆者加陳皮半夏其餘六經治例皆同必以
四物為主乃養血務本之要也劉河間曰大抵產病天行從增損柴胡
雖症從增損四物宜詳察脉症而用之

膠艾湯金匱治婦人漏下或半產後下血不絕或妊娠下血腹痛為胞阻

漏下青懷妊而經來以陽不足謂之激經半產者四五月而墜胎墜胎必傷其血海血因續下不絕也亦治損傷衝任月

水過多淋瀝不斷此即崩症

阿膠 茜草 甘草 艾葉 當歸 芍藥 地黃 水五

升酒三升煮取三升內阿膠烱化服一升方加乾薑三兩胡氏治胎前

治胎動經滿腰痛腹滿搶心短氣加黃芩干金藥治從高墜下損傷五

藏吐血及金瘡經肉絕者加乾薑

此足太陰厥陰藥也四物以養其血阿膠以益其陰艾葉以補其陽和

以甘草行以酒勢使血能循經養胎則無漏下之患矣

又方阿膠一斤蛤粉炒艾葉收華亦名膠艾湯長治胎動不安腰腹疼

痛或胎上搶心去血腹痛指迷方加秦艽婦人受胎一月形如珠乃

不腫足厥陰脉主之經水即閉飲食稍異二月如桃花瓣乃太極靜而

生陰地二生火謂之暉足少陽脉所主若吐逆思食名曰惡阻有孕明

矣或偏著一物乃大藏之虛如愛酸物乃肝經只能養胎而虛也三月

如清鼻涕先成鼻與雞雄二器乃分男女手脈陰相火所至胎最易動

四月始受小精以成血脉形像具手足順成手少湯脉所至五月始受
火精筋骨四肢已成毛髮始生足太陰脉所至六月始受金精以成筋
口目皆成足陽明脉所主七月始受木精以成骨遊其神能動左手手
太陰脉所至八月始受土精以成皮膚九竅皆成遊其魄能動右手手

陽明脉所主九月始受石精百節畢備三轉其身足少陰脉所主十月神氣備足乃生足太陽脉所主惟手少陰太陽無所至者若至之月無為而已附胎須妨三五七月宜服清熱涼血安胎之藥

瘧疾治動

鈎藤湯

方良

治瘧瘧胎動不安

瘧瘧手足抽掣也熱為陽風主動肝風相火為病也

鈎藤鈎

當歸

茯神

人參

桔梗

桑寄生

分

風熱加黃芩梔

子柴胡白水風痰加半夏南星竹瀝風勝加全蝎僵蚕

此足厥陰藥也鈎藤之甘寒以除心熱而散肝風柴胡桔梗之辛涼黃

芩梔子之苦寒以平少陽厥陰之風熱風熱去則瘧瘧止矣人參茯神

以益氣而寧神當歸寄生以養血而安胎也

羚羊角散

本事方

治妊娠中風涎潮怨仆目赤口噤角弓反張名子癇

靜陽主動風陽邪也諸風肢痺皆屬肝本故有搖搖眩胃反張之症

羚羊角

屑一錢

獨活

防風

芍藥

當歸

惠仁

炒

茯神

杏仁

薑

仁五分木香二分甘草二分加薑煎一方有五加皮

此足厥陰藥也羚羊之辛涼以平肝火防風獨活之辛溫以散肝邪茯神酸棗以寧神當歸川芎以活血杏仁木香以利氣薏仁甘草以調脾也扶土所以心水恢復仁亦治筋急拘攣之症

子懸
紫蘇飲蘇氏治胎氣不和湊上胸腹腹滿頭痛心腹腰脇痛白子懸由下焦氣

實用水旺盛舉胎而上上通心胸也

蘇葉一錢當歸七分芍藥 人參 陳皮 大腹皮五分甘草二分加

薑煎空心服心腹痛者加木香玄胡索

此手足太陰厥陰藥也陳來章曰芍藥以和其血蘇橘大腹以順其氣氣順血和則胎安矣既利其氣復以人參甘草養其氣者順則順其邪逆之氣養則養其沖和之氣也

子氣

天仙藤散

陳景初

治子氣

婦人衝任素受血風因妊娠而足腫喘悶妨食甚則脚指出黃水病名子氣非水也

天仙藤

即生木香藤微炒

香附

炒

烏藥

陳皮

甘草

炙

等分加紫蘇三葉

木瓜生薑各三片空心煎服或為末湯調下目三服

此手足太陰藥也天仙藤之苦溫疏氣活血能解血中之風氣香附烏

藥陳皮之辛溫以行鬱氣紫蘇生薑之辛溫以疏表氣甘草之甘緩以

和正氣少加木瓜以除濕熱利筋骨調榮衛也

子腫

白朮散

金

治子腫面目肢體虛附如水狀

胎中挾濕水與血搏濕氣流溢故令面目肢體浮腫亦名

胎水原因煩渴引飲過多或泄瀉損傷脾胃脾虛不能治米五六箇月多有之

白朮

一錢

薑皮

陳皮

茯苓皮

大腹皮

五

為末

米飲下指迷有方

桑皮白皮無白朮

此即五皮飲

丹溪除薑皮腹皮加川芎木通補中導水行

氣此症有張鯉魚

子煩

此足太陽太陰藥也小病當令上下分消薑皮橘皮辛而能散使水從
手少陰出皮苓皮瀝而能泄使水從溺竅出水盛由于土衰故用白朮
之甘溫以扶脾土而堤防之不致泛溢也

竹葉湯

治妊娠心

胆怯終日煩悶名子煩

受胎四五箇月相火用事
成盛夏君火火行俱能乘

肺火致極乘胎動不安亦有停
痰積飲滯于胸膈以致煩躁也

麥冬

黃芩

錢一人參五分淡竹葉十片

一方茯苓為君無人參有

防風一本無人參有防風知母如有痰者加竹瀝

此季秋當少陰藥也竹葉清煩黃芩消熱麥冬涼肺

心火乘肺故煩出于肺

茯苓

寧心人參補虛妊娠心煩固多虛也

如相火盛者單知母九君火盛者
單黃連九心神不安者珠砂安神

凡切不可作虛煩
用施技等藥治之

紫苑湯

治子嗽

子嗽

方

方

方

方

方

子淋

紫苑冬一桔梗分五甘草炙桑白皮杏仁分三竹茹分二八寶溫服

此手太陰藥也子嗽由于火邪當以清火潤肺為務桔梗桑皮之涼以

瀉之天冬竹茹之寒以清之紫苑炙草之溫杏仁白蜜之潤以潤之也

安樂散水事治子淋心煩悶亂子淋勝脫小腸虛熱也虛則不能制水熱

問亦有因房勞內傷胞門衝人參細辛二兩黃芩任虛者當入珍湯或腎氣丸木通滑石麥冬三錢為末每二錢麥冬湯下

此手太陰足太陽少陰藥也陳來章曰盛熱宜補故用人參甘草之甘

淋問宜通故用木通燈草之滲滑石之滑肺燥則天氣不降而麥冬能

清之腎虛則地氣不升而細辛能潤之經曰地氣上為雲天氣下為雨

血燥則治不濡而當歸能滋之也上下交陰陽和而後便得通也

參朮飲丹治妊娠轉胞情胞者胎道及胞壓在一邊也系轉戾濟下急

當歸熟地黃芍藥人參白朮陳皮留半夏甘草

昂按治下
部不通
每吐
洁用

如養血心服

此即八珍湯而去茯苓加陳皮半夏以除痰也

此足太陰厥陰藥也脾虛補以四君血虛補以四物痰飲消以二陳使

氣得升舉而肥曰通也

朱丹溪曰轉胞之病婦之稟受弱者憂悶多者

効因思慮不自轉為胎所壓胎苦舉起胞系自礙水道自通矣近吳宅

能人忠此脉似瀉重則強予曰此得之憂患端為血少氣多強為有飲

血少則胎弱不能舉氣多有飲中焦不清而臨則胎知所避而就下乃

以上藥與服隨以指探候中吐藥汁候氣定又與之八貼而安此恐

偶中後胎動人皆効仲景云婦人本肥盛今反益瘦胞系了戾但

利小便則愈宜服腎氣丸以中有茯苓故也地黃為君功在補胞

又法將孕婦倒豎胎轉而小便自通矣

附丹溪參朮膏人參

二錢五分白朮二錢黃耆中

錢一錢茯苓陳皮桃仁各一炙甘草

分用猪羊胞煮湯入藥煎服治產後胞損成淋瀝症

丹溪曰收生不謹以致損胞而得淋

症有徐氏婦壯年患此因思肌肉破傷在外者且可補完胞難在內恐

亦有治診其脉虛甚因悟曰難產之人多是氣虛難產之後血氣甚虛

因用峻補以參朮膏煎以猪羊胞極服時與之旬劑一兩

一月而安蓋令血氣驟長其胞可完若補遲緩恐難成功

行血
下胎

黑神散局

治產後惡露不盡攻衝作痛及胞衣不下胎死腹中

由血瘀不行也

熟地黃

歸尾

赤芍

蒲黃

桂心

乾薑

甘草

黑豆

炒去皮

每服二錢酒童便各半煎便產須知有生地黃

此足太陰厥陰藥也前症皆因血瘀不行熟地歸芍之潤以蒲血蒲黃

黑豆之滑以行血

芎藭行血則蒲黃當生用

桂心乾薑之熱以破血

乾薑辛熱能去惡生新或產後

發熱必用之

用甘草者緩其正氣用童便者散其瘀逆加酒者引血分以

助藥力也

產後惡露不行氣滯血凝胞衣不下則宜全用快行之也剛目日寒多及秋

冬宜之苦性急形瘦有火及夏月當審用此丹溪之論

古黑神散有草霜白芷等分每二錢煎入童便

少許和服治橫生逆

產及前產後虛損崩漏等症

血痛

失笑散局

治惡露不行心包絡痛或死血腹痛

惡血阻而不行上衝下阻于腹中皆同

痛

蒲黃 五靈脂 等分爲末煎膏醋調服

此手足厥陰藥也生蒲黃性滑而行血五靈脂氣燥而散血氣脈皆能入厥陰而活血止痛故治血痛如神

水方名一兩加水通赤芍各五錢每四錢入鹽少許服各通露散治九種心痛

產後清魂散氏

治產後惡露已盡忽減暈不知人

產後氣血虛弱又感風邪也

澤蘭葉

人參

分三川芎

分五荆芥

錢一甘草

分三

爲末溫酒調下更宜燒

漆器煇醋炭于床前使聞其氣

此足厥陰藥也氣血虛弱故以芍藥澤蘭養其血人參甘草補其氣外感風邪故以荆芥疏其風風邪去氣血生則神清矣肝藏魂故曰清魂

調經
利產

醫方集解 卷八 婦人部 經水不調 五

荆芥最散血中
之風故以爲君

返魂丹
即益母草
青丸產寶

治月經不調赤白帶下胎前產後一切諸病

五月五日六月六日或小暑日
益母草花正開時連根採收陰乾用花
葉及子石臼搗末蜜丸或搗汁干砂鍋內文武火熬成膏服忌鐵如胎
動腹痛下血不止當歸湯下橫生逆產胎衣不下炒鹽湯下產後血暈
口渴狂言產後中風失音口噤及血結奔痛時發寒熱面赤心煩或鼻
衄舌黑口乾並童便和酒下產後喘嗽惡心吐酸脇痛無力酒下產後
瀉血聖湯下產後痢疾米湯下產後崩漏糯米湯下產後帶下膠艾湯
下產後二便不通煩躁口苦薄荷湯下凡產後以童便化下一丸能安
魂魄調經絡破血痛經不調者服之則調久無子者服之則孕
此手足厥陰藥也益母草功擅消水行血去瘀生新利大小便故爲經

勞

產後藥而又能消疔腫散乳癰也

孫明華一各走難李時珍曰益母草根花葉俱皆可用若治血分風熱

當歸羊肉湯 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰歸勞

黃耆補人參 當歸補血生薑五錢 用羊肉一斤煮汁去肉入前藥煎服

如惡露不盡加桂辛熱惡露下多加川芎有寒加吳茱萸有熱加生薑

汁有氣加細辛

此手足太陰厥陰藥也參耆補氣而固衛當歸養血而調榮生薑辛溫

引氣藥入氣分而生新血羊肉甘熱用氣血之屬以補虛勞熱退而汗

收矣

養血 安胎

本方除人參黃耆用羊肉一斤薑五兩三兩當歸生薑羊肉湯治產後

腹中疝痛及寒疝腹痛勞不足勞音鳩又音

當歸散

婦人妊娠宜當服之

婦人胎少者宜服之胎無疾苦臨盆易產產

後百病悉

者王

當歸 芍藥 芎藭 黃芩 白朮 為末酒調服日二

此足太陰厥陰衝任藥也衝任血盛則能養血而胎安芎藭芍藥能養血而益衝任又懷妊宜清熱涼血血不安行則胎安黃芩養陰退陽能除胃熱白朮補脾燥濕亦除胃熱胎氣係于脾脾虛則帶無所附故易落脾胃健則能運化精微取汁為血以養胎自無惡阻嘔逆之患矣故丹溪以黃芩白朮為安胎聖藥也

易簡方加山藥黃芩治經三四月不行或一月再至數月不行者自少也

之以白朮山藥一月再至者脾虛有熱也白朮能補脾黃芩能涼血山藥能固經

啟宮丸 治子宮脂滿不能孕育婦人肥盛不孕者以子宮脂滿壅塞故不能受胎也

外肥

青龍 白朮 牛夏 麴 香附 兩 茯苓 神麴 錢 枳殼 紅 甘草 錢 蘇

丸

此足太陰厥陰藥也橘半白朮燥濕以除其痰香附神麴理氣以消其

滯川芎散鬱以活其血則壅者通塞者啟矣茯苓甘草亦以去濕和中

助其生氣也脾而不木多由痰盛故以二陳為君而加氣血藥也

達生散亦各東胎婦人妊娠八九月服數十劑易生有力詩云誕彌厥月先生如達

達小羊也其生甚易產難多因氣血虛弱藥術滯澁服此期易生如達矣

當歸酒洗芍藥酒洗人參 白朮土陳皮 紫蘇錢一甘草錢二大腹皮錢三

八青葱五葉黃楊腦子七個煎黃楊木主產難或加枳殼砂仁或春加川芎夏

加黃芩冬加木芍或有別症以意消息

此足太陰厥陰藥也當歸芍藥以益其血人參白朮以益其氣腹皮陳

皮紫蘇蔥葉以疏其壅氣血不虛不滯則臨產自無留難之患矣

朱丹溪曰

產難往往見于發問安藥之人富貴奉養之室若貧賤者鮮有方古方有瘦胎飲為湖陽公主而作恐非至到之言予族妹苦于難產遇胎期而而去之于其間馬視其形胞而勤于女工知其氣血入坐不運男因母氣虛亦不能自運耳常補母氣則兒健易產令其有孕五六月以大全良方紫蘇飲加補氣藥與之數十貼得男甚快因以其方隨母之性稟與時令加減服無不應因名曰達生散云○昔湖陽公主難產方士進瘦胎飲用枳殼四兩炒甘草二兩炙五月後日服一錢擦古改以枳不名求胎九冠宗夷明其不然蓋孕婦生賴血氣以養胎血氣充實胎乃易生彼公主奉養太過氣實有餘故可服之若一條濫施誤之甚矣按瘦胎飲又名枳殼散治胎肥難產臨月服之張氏加香附行氣寬膈產湯下許學士云大率妊娠惟在抑陽助陰其方甚多亦惡羣隊枳殼散所以抑陽助陰所以養胎然枳殼散寒宜以內補九佐之即當

歸一兩地黃二兩為丸也

通乳
猪蹄湯
治乳少

猪蹄一隻
通草一兩
煮食

此足陽明藥也猪蹄能潤下通草淡能通散

風

廣濟方用猪蹄四隻煮汁加土瓜根漏蘆木通各三兩通經下乳

少米煮煮稀粥食治同或以猪蹄湯調益元散服以木梳梳乳房乳

汁自下又等山甲王不留行皆通乳之藥俗

人參荆芥散治血風勞血風勞者血脈之使感受風邪

人參白朮熟地黃酸棗仁炒驚風羚羊角枳殼柴胡

荆芥分五防風甘草芍藥當歸桂心分三加薑煎

此足太陰厥陰手少陰藥也陳來章曰血中之風荆芥防風散之大盛

生風羚羊柴胡平之陰虛發熱地黃驚風滋之血氣痛帶月水不調芍

藥當歸桂心枳殼調之煩怠食少盜汗心忪人參白朮炙草杏仁補而

收之

少

柏子仁丸治經行復止血少神衰女子善懷每多憂思憂多則傷心

九

肝無所大而衝任之脉枯故經閉不行也。經日月事不來者胞脉門也胞脉者屬心而絡于胞中令氣上通肺心氣不得可降腎事不來月

也

也

也

也

也

也

也

也

也

此手足少陰厥陰藥也柏子仁安神而養心地黃續斷牛膝補肝腎而

益衝任卷柏澤蘭活血脉而通經閉

卷柏生用破血炙用止血李珣曰

行一月一見其來有常故日月經或外被風寒燥濕暑熱或內傷生令

或七情鬱結為痰為瘀滯于內日血滯或用力太過入房太甚或服

食燥熱以致火動邪氣盛而津液喪日血枯若經後被驚血氣錯亂而

妄行逆上則出于口鼻小血相搏則為水腫怒極傷肝則有眩暈嘔血

瘰癧瘡瘍等並溫熱相傳則為崩帶凝結于內則為瘕瘕或暴怒發熱

出血帶與血枯而且血滯經閉宜破者原因飲食熱毒或暴怒發熱

痰其須大黃乾漆之類推陳致新俾舊血清而新血生矣皆氣旺血

起于勞役憂思却宜溫補或兼痰火濕熱尤宜清之涼之每以肉桂為

左背熱則血行也但不可純用峻藥以虧陰道至于耗氣益血之說雖

女科要法但氣為血配氣熱則熱氣寒則寒氣甘則升氣降則降氣

則行氣滯則滯如果鬱火氣盛于血育方可用厚杏肘散抑氣散加木

香滋潤和緩行氣開鬱若氣亂則調氣冷則溫氣虛則補男女一般陽

主則陰自長氣耗則盛

亦稱豈可專耗其氣哉

經脈

為歸六君子湯

治經水後期其來澹少形體體肥而經水後期者益少者氣盛而痰滯

經絡也

當歸 芍藥 人參 白朮 茯苓 甘草 橘紅 半夏 加蘇煎

此足太陰厥陰藥也二陳治其痰滯參朮補其氣虛氣行則痰行。芎歸活其

經血

連附四物湯丹

治經水後期其來澹少形體體熱甚者過期而或益少風冷乘之也若痰

白者虛也若挾痰停水以混之也如痢
塵豆汁尾漏水混濁橫痃者濕痰也

四物湯見血部加香附黃連

此手少陰手足厥陰藥也四物以益陰養血加黃連以清血熱香附以

行氣

四物加枳朮湯亦名溫大合湯治經水過多黃芩加陽白朮四物加芩連湯治

清少集降症

周澤九

經水適斷五心煩熱經來色黑或如豆汁

或如豆汁熱兼濕也

四物

加梔運為熱六合湯加薑附為寒六合湯加陳朴為氣六合湯加羌活

為風六合湯皆婦病與經產通用之藥也

血熱崩漏

固經丸方治經行不止及崩中漏下紫黑成塊

衝任為經脈之海若無損傷則血氣和平血氣

調適矣其勞動過度損傷藏府衝任之氣虛不能約制經血故經多漏下或由陰虛陽搏為熱所乘致傷衝任血得熱則妄行也脈數疾外為

順大者為逆紫黑成塊者熱甚而反兼水化非寒也玉機微義曰血得寒則凝既行而紫黑故知非寒也

龜板

炙四兩 芍藥

酒炒 黃柏

酒炒 三兩 黃芩

炒二兩 香附

酒炒 梔皮

此足少陰厥陰藥也經多不止者陰虛不足以制胞絡之火故越其常

度也崩中漏下者虛而挾熱也紫黑成塊者火極似水也黃芩清上焦

之火黃柏瀉下焦之火龜板芍藥滋陰而養血皆壯水以制陽光也香

附辛以散鬱積皮脂以止脫

男婦

升陽舉經湯

治崩漏身熱自汗短氣倦怠飲食不進此由

補中益氣湯

見氣

加白芍照梔子

薑三片或三枚煎

此足太陰陽明藥也補中湯以益氣升陽退熱收汗加芍藥以和血欬

陰黑梔以清熱止血

又東垣蘭室秘藏升陽舉經湯黃耆歸白朮各三錢羌活防風藥本二

獨活附子

甘草

人參熟地川芎

細辛

桃仁

花肉桂

每服三錢

漸加至五錢治經水不止

原

之空虛是氣血俱脫大寒之症輕手其脉數疾舉損弦緊或澀皆陽脫之症陰火亦亡見熱症于口鼻眼或渴此皆陰燥陽欲先亡也當溫之

氣血切補命門之下脫也

止崩

如聖散

治崩漏不止

凡非時血行淋瀝不已謂之漏下忽然暴下如山崩然謂之崩中有五色以應五藏

櫻櫚

烏梅

為末每服二錢烏梅湯下

醫方集解

卷六升陽舉經湯如

丹皮散

詩

血癥

氣滯
氣阻

此足厥陰藥也。滴能止血，故用櫻桃酸能收斂，故用烏梅溫能守中，故用乾薑黑能止血。火也勝水故並用。

牡丹皮散

良方

治血癥

瘕者瘀血凝聚而成也。伏于隱僻之處，盤結膠固，非攻伐之不易平也。

丹皮桂心

歸尾

延胡索分三牛膝

赤芍藥

莪朮分六三稜分四

水酒各半煎

此足厥陰藥也。桂心丹皮赤芍牛膝以行其血，三稜莪朮歸尾延胡以行其血中氣滯，氣中血滯，氣血過流則結者散矣。

正氣天香散

珠珀

治一切諸氣氣上湊，心心胸腹氣助刺痛，氣不調。

婦人多憂鬱，故氣病為多，氣為血配，氣滯則血亦不能行，故月候不調也。

香附

八錢烏藥

錢二陳皮

蘇葉

錢一乾薑

錢五每五六錢煎

此手太陰足厥陰藥也。烏藥陳皮入氣分，而理氣香附蘇葉入血

分而行氣引以乾薑使入氣分兼入血分用諸辛溫以解鬱散肝令氣

調而血和則經行有自常無痛壅之患

氣盛于血

抑氣散

治婦人氣盛于血變生諸症頭暈膈滿凡入血氣和平則無諸疾苟血少氣多

于胸膈則滿上攻于頭則暈矣

香附

四兩

陳皮

二兩

茯苓

甘草

為末每服三錢

此手太陰少陽藥也經曰高者抑之香附能散鬱氣陳皮能調諸氣伏

神能安心氣甘草能緩逆氣氣得其平則無亢害之患矣若鬱甚者當

于理氣門中諸方選用不必泥此

昂按氣盛于血固當抑氣若過用行氣之藥則真氣耗散陰火愈盛而成

氣血而虛矣是方平和為可常用或用滋血之藥使陰而充足而陽火自平亦正治之一法蓋仙其手足即所以制其有餘也

濕熱帶下

回下丸

和子

治赤白帶下

帶下起于風寒濕熱所傷八于胞中或中經脈流人藏府陰虛陽竭禁氣不升衛氣下陷滯于

下焦奇經之分因帶脈而得各故曰帶赤者屬血白者屬氣其狀如涕相連而下言帶者亦病形也有濕流滯下焦者有肝腎陰淫濕勝者

香附 茯苓 陳皮 甘草 正氣天香散

回下丸

三

有驚恐而木乘土位溺液下流者思慮無窮而為白淫者或餘經濕熱屈滯于小腹之下者病本雖殊皆為氣血虛損榮衛累滯而成其標也則

梲皮兩半白芍五錢良薑煨黑黃柏三錢

三錢

粥丸米飲下

此足少陰厥陰藥也陳來章曰梲皮苦燥濕寒勝熱潛固下故赤白帶因于濕熱者用之為君古方有蒼柏梲皮側柏梲皮芩柏梲皮芩木梲皮等九隨症加香芎歸芍薑芷及星夏等藥芍藥之酸飲陰氣收下溜為臣良薑之熱以散寒濕黃柏之寒以祛熱濕並炒黑以止血收脫為佐使也

虛熱帶下

當歸煎丸氏

治赤白帶下腹中痛不飲食羸瘦

此血虛有熱之症法當

為白帶漏下多時骨本枯言崩久則血少復亡其弱故白滑之物下漏不止

此足少陰厥陰藥也歸芍熟地續斷阿膠補肝滋腎以治血虛牡蠣地榆清熱收脫以止帶下赤芍酸寒能散惡血去瘀所以生新散之所以

收之也

以上八味醋
御左米飲下

白芷散

長方

治赤白帶下脫不禁

長方口帶下由于風寒濕熱所傷傷肝
經黃色青如泥傷心經者色赤如濕傷

加經者色白如帶傷脾經者黃
如爛瓜傷腎經者黑如鮮血

白芷

一兩

海螵蛸

二個

胎髮

一錢
為末酒調下二錢

此足陽明少陰厥陰藥也白芷辛溫燥濕而祛風烏

則即海鹹溫收濕

而和血髮著血之餘補陰消痰煖黑又能止血也

救急良方

人之以疾病死而得終其天年者雖不幸猶幸也乃有暴
橫之遺大如經溺此盡蛇夫之傷小如骨哽刀金湯火之

害坐視其轉死莫之能救者多矣茲取簡便良方
以備緩急倘用此而救活一命于人心獨無愧乎

暴死

凡人涎壅于心卒然倒仆急扶入煖室扶策正坐用火炭沃醋使

醋氣衝入病人鼻中良久自甦或搗韭菜汁灌鼻中或用皂角末吹入

鼻中得嚏則醒倉卒無藥急于人中穴及兩足大拇指離甲一韭葉許

各灸三五壯即活 凡人卒然昏倒身冷無痰此名氣厥亦名中氣若身溫有痰者

則名中風但扶正坐氣順即安或用皂角末吹鼻令嚏亦佳 凡冬月中寒

卒倒身強口禁手足厥冷如無醫藥當濃煎薑湯灌之 凍死有氣者

以灰炒熱盛囊中熨其心頭冷即易之若遽以火烘冷與火爭必死浴

以熱湯亦死或用薑汁熱酒各半溫服 凡暑月道中中熱卒死以路

上熱土圍臍令人尿其中即活薑湯重便乘熱皆可灌之或用熱土大

蒜等分搗水灌之或置日中或令近火以熱湯灌之即活切勿飲以冷

水反臥冷地正如凍死人若遠近火即死

縊死 急令手裏衣物緊繫殺道抱起解繩安放正平樹髮向上探其項

痕捻圓喉管腳踹兩肩以兩管吹氣入耳內或刺雞冠熱血滴口中男

用雌女用雄鼻節氣轉或再屈伸其手足將手摩之或氣不接將腰打

三匹尋或以皂角末搗切不可割斷繩索雖自至身冷猶可活

溺死 急倒提出水用牛一頭令橫卧以腹合牛背上牽牛徐行令吐出腹中之水以老薑擦牙即活口紫者攪開橫一筋于牙間使水得出如無牛以鍋覆地將病人臍對鍋臍俯卧以手托其頭水出即活或俯卧轆上脚後稍高離地擦臍中待其水自流出或用皂角末綿裹納下部出水即活切忌火烘逼寒入內不救

魔死 如原有燈即得切忌火照但痛咬其脚跟或咬大指拇而垂其頭或以皂角末吹入鼻中得嚏即醒

中毒 凡中蠱毒令醬白醬不瀝食黑豆不醒即是中毒可濃煎石榴皮汁飲之或熱茶化胆礬半錢探吐吐惡毒或米飲調鬱金末三錢令下凡中砒霜毒急飲以人溺及人黃汁或搗烏柏樹根葉汁或藍汁令

服或刺手血熱服或取生螺研冷水服 中鹽兩毒縱飲生豆腐漿解
之中諸菌諸毒及虫蟻入腹黃土和水飲下之 綠豆湯甘草湯能
解百毒

服鉛粉 以麻油調蜂窠加飴糖與服

蛇虫犬咬傷 凡惡蛇傷急于傷處上下緊縛使毒不散走隨浸新缸內
食蒜飲酒令飽使毒不攻心或礬石甘草等分冷永服二三錢更搗蒜
敷患處加艾間灸之此法兼治百虫毒螫又方五靈脂一兩雄黃五錢
酒調服滓敷患處又方貝母爲末酒調盡醉飲之頃久酒自傷處爲水
流出候水盡以藥渣敷瘡上垂死可活 凡蜈蚣傷取大蜘蛛放傷處
吸去其毒卽投蜘蛛于水中令吐毒以全其命又方生雞血傅之又法
鹽水洗淨鵝涎或蜚蠊之壁壁虎咬用桑葉灰水煎數沸濃汁調白

藥末塗之

蝎子螫用白礬半夏等分醋調塗之

外症日凡遇一咬毒

向之亦不得殺之若執

凡瘋狗咬傷急用菴米熬半個碎切斑蟊七

個去頭翅足若過一日加一個糯米一撮慢火炒脆去斑蟊取米研末

好酒調服服下惡物多自凶者頭上有紅髮三根拔去之若仍凶腹內

有狗聲者再加木燐一個用斑蟊甘一枚如前製法與服後以黃連甘

二解之三月不可聽鐘鼓聲再發則難治終身不得食羊犬肉稍輕者

急下無風處捏去惡血孔乾者針刺出血用小便或菴湯洗淨搗葱貼

上若常大咬者洗淨血水用虎骨煨研敷患處或爛嚼杏仁傳之

湯炮傷 雞子清調大黃末塗之炒黃柏末亦可一法以冷燒酒燒淋甚

妙

刀斧傷

割痔蟬蛻末傳之血立止

古墻石灰搗末傳之亦佳金鎗血出

諸方集解

救急

卷六

蛇虫大咬傷湯

骨漿

美

不止用厚蚕蛾炒為末敷之

骨哽 凡魚骨哽食極櫛節下如無鮮者用櫛櫛磨水飲之

歌兒本作丹根魚觸

着即死物之相是有如此者

又猫涎亦能下魚骨哽

凡雞骨哽用野苧根搗爛如

龍眼太鷄湯化下如魚骨哽魚湯化下

猪骨哽用犬尿一足取其涎

徐徐嚥下或用硼砂并花水化下或醋煎威靈仙嚥下

或如砂糖或雞心

子煎湯嚥下

凡治哽之法可以類推如屬雞觸掌治魚哽磁石拾寸更屢天治髮哽虎大治骨哽亦各從其類也

誤吞銅鐵金銀

但多食肥肉自隨大便而出吞針者煮蠶豆同韭菜其

針與菜自從大便出誤吞銅者食草薺次蒜即化

吞髮鐵咳不出

取白臘燒灰白湯調下一錢

煩事開不能合醉

之睡中用皂角末吹其鼻嚏透自合

呃逆不止

用紙捻刺鼻中得嚏即止

舌脹滿口

刺雞冠血浸紙捻頸上麻油燭燭灸以生肌保之或加

乾薑末

乳蛾喉痹

凡乳蛾水漿不人者先用皂角末點破再取杜牛膝汁和醋

含嚥又法艾葉搗汁口含良久腫自消冬月無葉搗根用之又喉閉者
取山豆根汁含嚥即開有藥不能進者急取病人兩臂撻數十次使血
聚大指上以髮繩扎住指拇針刺指甲縫邊出血如放沙一般左右手
皆然其喉即寬

霍亂絞腸痧

以針刺其手指近中處一分半許出血即安仍先自兩臂

撻下令惡血聚于指頭後刺之

鼻衄不止

亂髮燒灰存性細研水服併吹入鼻中又白芨末新汲水調

下又紙數十層水浸濕安頂中以火熨之紙乾立止又用線扎中指中

節左孔出血扎左指右孔出血扎右指兩孔出血則俱扎之又以大蒜

搗餅貼定心

重入耳中

用猫尿滴耳中虫即出

以生薑擦貓鼻貓即尿

跌打損傷

韭汁和童便飲散其瘀血骨折者蜜和葱白搗勻厚封酒調

白芨末二錢服

產婦血暈

扶坐燒炭沃醋或燒舊漆器令烟入其口鼻即甦

產後子腸不收

醋三分冷水七分和麝產婦面一嚥一縮三嚥即收又

法以草麻子十四粒去殼搗膏塗頂心即收收即去之又法皂角末吹

鼻中嚏作立止

勿藥玄詮

人之有生備五官百骸之軀具聖知中邦之德所係非細也

父母之生成不鮮孰大焉故內經曰聖人不治已疾之未病天病已成而後藥之焦猶溺而穿井闢而鑄兵不亦晚乎故取養生家言淺

妄

近易行者聊錄數則以應信士之修持又將飲食起居之禁忌撮其
大要以爲縱恣者之防範使人知謹疾而却病不猶勝于藥藥而求
醫也

乎

內經上古天真論曰上古之人法于陰陽和于術數保生之法飲食有節起居
有時不妄作勞故能形與神俱而終盡其天年度百歲乃去今時之人
不然也以酒爲漿以妄爲常醉以入房以欲竭其精以耗損其真不知
持滿恐傾之意不時御神務快于心逆于坐樂起居無節故半百而衰也夫
上古聖人之教下也虛邪賊風避之有時恬淡虛無真氣從之精神內
守病安從來

調息

調息一法貫徹三教大之可以入道小用可以養生故迦文垂教

以視鼻端目數出入息爲止觀初門莊子南華經曰至人之息以踵大
易隨卦曰君子以嚮晦入冥息王龍溪曰古之至人有息無睡故曰嚮

晦入冥息。冥源之法。當同晦時。目無見。四體無動。心無思慮。如
種火相似。先天元神元氣。停育相抱。真意綿綿。老子曰。綿綿若存。開闔自然與
虛空同體。故能與虛空同壽也。世人終日營擾精神。困憊夜間。靠此一
睡。始穀一日之用。一點靈光。盡為後天濁氣所掩。是謂陽陷下陰也。

調息之法。不拘時候。隨便而坐。平直其身。縱其體。不倚不曲。解衣衣緩帶。

腰帶不寬。則上下氣不流通。

務令調適。口中舌攪數遍。微微呵出濁氣。不得有聲。鼻中微

微納之。或三五遍。或一二遍。有津嚥下。叩齒數通。舌抵上腭。唇齒相着。

兩目垂簾。令臃臃然。漸次調息。不喘不粗。或數息出。或數息入。從一至

十。從十至自攝心。在數勿令散亂。如心息相依。雜念不生。則止。勿數任

其自然。坐久愈妙。若欲起身。須徐徐舒放手足。勿得遽起。能勤行之。靜

中光景。種種奇特。直可明心悟道。不但養身全生而已也。調息有四相。

呼吸有聲者風也守風則散雖無聲而鼻中漚漚者喘也可喘則結不
聲不滯而往來有形者氣也守氣則勞不聲不滯出入綿綿若存若亡
神氣相依是息相也息調則心定真氣往來自能奪天地之造化息
歸根命之帶也

蘇子瞻養生頌曰已飢方食求飽先止散步逍遙務令腹空當腹空時即
便入室不拘晝夜坐臥自便惟在攝身使如木偶常自念言我今此身
若少動搖如毫髮許便墮地獄如商君法如孫武令事在必行有死無
犯又用佛語及老聃語視鼻端自數出入息綿綿若存之用不勤數至
數百此心寂然此身兀然與虛空等不煩禁制自然不動數至數千或
不能數則有一法強名曰隨與息俱出復與俱入隨之不已一旦自住
不出不入忽覺此息從毛竅中入萬四千雲霧散無始以來諸病自

無息

無息

無息

除諸障自滅自然明悟定能覺悟如盲人忽然有眼此時何用求人指路是故老人言盡于此

小過天 先要正念身心澄定面東跏坐平坐亦可但前膝不可低腎子不可着物呼吸平和

用三昧耶指無名指右掌加左掌上按于臍下叩齒三十六通以集身神赤龍攪海

內外三十六過亦龍舌也內雙自隨舌轉運舌抵上腭靜心數息三百

六十過天畢待神水滿漱津數通用四字訣抵上腭閉目閉上視鼻吸莫

從任脉撮過穀道到尾閭以意運送徐徐上夾脊中關漸漸速些閉

目上視鼻吸莫呼撞過玉枕後將目往前一忍直轉崑崙頭倒下

橋舌分津送下重樓入離宮心也而至氣海坎宮畧定一定復用前法連

行三次口中之津分三次嚥下所謂天河水逆流也靜坐片時將手左

右擦丹田一百八下連臍抱任放手時將衣被圍住臍輪勿令風入云

養得丹田後發訣次將大指背擦熱拭目十四遍去心火擦鼻三十六
遍潤肺擦耳十四遍補腎擦面十四遍健脾雙手掩耳鳴天鼓徐徐將
手往上卽朝天揖如此者三徐徐呵出濁氣四五口收清氣雙手抱肩
移筋換骨數遍擦玉枕關二十四下擦腰眼一百八下擦足心各一百
八下

道經六字訣呵呬噯吹嘻 每日自子至巳爲六陽時而東靜坐必
閉意亦不令風入叩齒三十六通舌攪口中候水滿時漱鍊數遍分三
口咽嚥嚥下以意送至丹田微微撮口念呵字呵出心中濁氣念時不
得有聲反損心氣卽閉口鼻吸清氣以補心吸時亦不得聞吸聲但呵
出令短吸入令長如此六次再念呵字六遍以治脾再念呬字六遍以
治肺再念噯字六遍以治肝再念喜字六遍以治三焦客熱再念吹字

六通以治腎並如前法謂之六通詩曰六通也夏至阿心火自開秋咽

定收金氣潤冬入少三焦導邪除煩熱四

季長呼咽食切忌出声問口耳其功尤勝保神丹

一稱金訣曰一吸便提氣氣歸臍一提便嘔水火相見不拘行住坐卧舌

攪華池抵上腭候津生時漱而嚥下咽嚥有聲人一身之水皆藏於舌下華池之水甘淡又自

然下咽咽聲古脉自調勻隨以鼻中吸清氣一口以意自力同津送至臍下丹田

存一存謂之一吸隨將下部輕輕如忍便狀以意自力從尾間提起上

夾脊雙關透玉枕入泥丸謂之一呼周而復始久行精神強旺百病

不生

金丹秘訣曰一擦一匙左右換手九九之功真陽不走戌亥二時陰盛陽

衰之候一手托外腎一手擦臍下左右換手各八十一半月精固久而

潤佳

李東垣曰夜半收心靜坐片時此生發週身元氣之大要也

精神生氣積氣生精此自無而之有也鍊精化氣鍊氣化神鍊神還虛此

自有而之無也

髮宜多梳面宜多擦目宜常運耳宜常鳴即耳鳴也舌宜抵腭齒宜數叩

津宜數嚥濁宜常呷背宜常煖胸宜常暖腹宜常摩穀道宜常撮肢節

宜常搖足心宜常擦皮膚宜常乾沐浴即洗也大小便宜閉口勿言

諸傷久視傷血久卧傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋暴傷傷陽氣

怒傷肝驚思傷脾極憂傷心過悲傷肺多恐傷腎善怒傷胆多食傷胃

醉飽入房傷精力勞作傷心春傷于風夏傷于暑秋傷

瘡瘡秋傷于濕冬必咳嗽冬傷于寒春必病溫夜寢語言大損元氣

故聖人戒之

風寒傷

沐浴臨風則病腦風

風寒風勞汗出

當風則病中風暑風夜露乘風則病寒熱卧起受風則病痺厥

乘涼

露冷則寒外侵飲冷食寒則寒內傷人惟知有外傷寒而不知有內傷

食不節房勞為然也周揚俊曰房勞未嘗不病陽虛頭痛發熱是也但

不可輕用涼藥耳若以會紀房勞便用溫藥殺人矣昂按諸書從未

有發明及此者世醫皆罕知之早起露首跳足則病身熱頭痛納涼

陰室則病身熱惡寒多食涼水瓜真則病泄痢腹痛夏走炎途食寒食

冷則病瘧痢

濕傷坐卧濕地則病癰厥風邪風售兩則病身重身痛長着汗衣則

病麻木發黃勉強涉水則病脚氣蠶卵飢餓暴浴則病骨節痛汗出

見濕則病瘧痢此亦言飲食傷經曰飲食自倍腸胃乃傷胃梁之變足也能生大疔瘡梁之疾消

癯瘦厥飽食太甚筋脉橫解腸辟為痔飲食失節損傷腸胃始病熱中
未便寒中 怒後勿食食後勿怒醉後勿飲冷引人皆曉則有飽食勿
便卧 飲酒過度則臧府受傷肺因之而痰嗽脾因之而倦怠胃因之
而嘔吐心因之而昏狂肝因之而善怒胆因之而忘惛腎因之而燥精
膀胱因之而溺赤二腸因之而泄瀉甚則勞嗽失血消渴黃疸淋瀝
疝為害無窮 鹹味能瀉腎水損真陰辛辣大熱之味皆損元氣不可
多食

色慾傷 男子二八而天癸至女人二七而天癸至交合太早斷其天
乃夭之由男子八八而天癸絕女人七七而天癸絕精血不生入房不
禁是自促其壽算 人身之血百骸貫通及徭事作撮一身之血至于

命門化精以世人之受胎也乃命火以育生也夫精者神倚之如魚得

命門化精以世人之受胎也乃命火以育生也夫精者神倚之如魚得

神必倚物方有附麗

也初嚴經曰火附

之如聚散無不知

實則百脉枯槁接無度必損腎元外雖不泄精已離宮定有直精

數照隨陽之疾而溢出如火之有烟燄豈能復返于游哉